



**Pero***Pyrus communis L.*

Specie: **Arboree**

Accessione: **BUTTIDU DE AUSTU**

Provenienza: **Villacidro**



## ALBERO

Vigore: **medio**

Portamento pianta: **eretto**

Lunghezza internodo rami 1 anno: **media**

Colorazione antocianica apice germogli: **debole**

Epoca fioritura: **intermedia**

Produttività: **scarsa**

## FOGLIA

Posizione foglia rispetto ai rami: **verso l'alto**

Dimensione foglia: **piccola**

Forma apice: **angolo retto**

Forma base: **ottusa**

Dentatura margine lamina fogliare: **crenata**

Lunghezza picciolo: **lunga**

Distanza stipole da base fogliare: **stipole assenti**

## FIORE

Posizione stigma rispetto a stami: **stesso livello**

Diametro fiore: **grande**

Forma petalo: **circolare**

Disposizione petali: **separata**

## FRUTTO

Epoca maturazione: **intermedia**

Dimensione frutto: **piccola**

Forma frutto: **turbinata**

Lunghezza peduncolo: **media**

Spessore peduncolo: **sottile**

Posizione peduncolo rispetto asse: **obliqua**

Colore di fondo buccia: **verde giallastro**

Estensione area sovraccolore buccia: **piccola**

Tonalità sovraccolore buccia: **rosso rosato**

Colore polpa: **bianco**

Tessitura polpa: **media**

Consistenza polpa: **media**

## **GIUDIZIO DI INSIEME**

Accessione scarsamente produttiva che presenta frutti di aspetto sgradevole, di scarso sapore e di ridotta pezzatura.

