

**Pero** *Pyrus communis L.*

Specie: **Arboree**

Accessione: **COZZONE 'E AINU**

Provenienza: **Bonarcado**



## ALBERO

Vigore: **medio**

Portamento pianta: **pendulo**

Lunghezza internodo rami 1 anno: **media**

Colorazione antocianica apice germogli: **debole**

Epoca fioritura: **intermedia**

Produttività: **scarsa**

## FOGLIA

Posizione foglia rispetto ai rami: **orizzontale**

Dimensione foglia: **grande**

Forma apice: **angolo retto**

Forma base: **ottusa**

Dentatura margine lamina fogliare: **seghettato**

Lunghezza picciolo: **lunga**

Distanza stipole da base fogliare: **corta**

## FIORE

Posizione stigma rispetto a stami: **inferiore**

Diametro fiore: **medio**

Forma petalo: **ovata**

Disposizione petali: **che si toccano**

## FRUTTO

Epoca maturazione: **tardiva**

Dimensione frutto: **molto piccola**

Forma frutto: **turbinata**

Lunghezza peduncolo: **lunga**

Spessore peduncolo: **sottile**

Posizione peduncolo rispetto asse: **obliqua**

Colore di fondo buccia: **verde giallastro**

Estensione area sovraccolore buccia: **media**

Tonalità sovraccolore buccia: **rosso arancione**

Colore polpa: **bianco**

Tessitura polpa: **grossolana**

Consistenza polpa: **media**

## GIUDIZIO DI INSIEME

Accessione scarsamente produttiva che presenta frutti di pessimo sapore e di ridotta pezzatura.

