

**Pero** *Pyrus communis L.*

Specie: **Arboree**

Accessione: **NATALINA**

Provenienza: **Berchidda**



## ALBERO

Vigore: **medio**

Portamento pianta: **fastigiato**

Lunghezza internodo rami 1 anno: **media**

Colorazione antocianica apice germogli: **molto debole**

Epoca fioritura: **intermedia**

Produttività: **elevata**

## FOGLIA

Posizione foglia rispetto ai rami: **verso l'alto**

Dimensione foglia: **media**

Forma apice: **acuto**

Forma base: **ottusa**

Dentatura margine lamina fogliare: **seghettata**

Lunghezza picciolo: **lunga**

Distanza stipole da base fogliare: **stipole assenti**

## FIORE

Posizione stigma rispetto a stami: **superiore**

Diametro fiore: **grande**

Forma petalo: **ovata**

Disposizione petali: **separata**

## FRUTTO

Epoca maturazione: **molto tardiva**

Dimensione frutto: **molto piccola**

Forma frutto: **turbinata breve**

Lunghezza peduncolo: **lunga**

Spessore peduncolo: **sottile**

Posizione peduncolo rispetto asse: **obliqua**

Colore di fondo buccia: **giallo**

Estensione area sovraccolore buccia: **media**

Tonalità sovraccolore buccia: **rosso rosato**

Colore polpa: **bianco**

Tessitura polpa: **grossolana**

Consistenza polpa: **soda**

## GIUDIZIO DI INSIEME

Accessione mediamente produttiva che presenta frutti con caratteristiche organolettiche non

degne di nota.



NATALINA



---

Copyright © 2017 **RISGENSAR** - Tutti i diritti riservati