Anguria*Citrullus lanatus* [Thumb.] Matsum. et Nakoi

Specie: **Ortive**

Accessione: **ANGURIA DI CARLOFORTE**

Provenienza: **Carloforte**

Anno collezione: 2014

Codice Accessione: 5

PLOIDIA

Ploidia: diploide

PIANTA

Lunghezza internodi: media

FOGLIA

Lunghezza foglia: 6,9

Larghezza foglia: 6,9

Grado lobatura primaria: forte

FRUTTO

Peso medio: medio (4,27 kg)

Forma sezione longitudinale: ellittica larga

Colore fondo epidermide: verde

Intensità colore fondo epidermide: medio

Forma zona apicale: da appiattita a tonda

Depressione apice: media

Depressione base peduncolo: profonda

Distribuzione solchi: su tutto il frutto

Intensità solchi: deboli

Striature: presenti

Tipo striature: chiaramente definite

Intensità colore striature: medio

Larghezza striature: molto strette

Spessore pericarpo: 1,2 cm

Colore principale polpa: rosso

Intensità colore principale polpa: chiaro

Numero semi: alto

SEME

Colore principale: bruno

Colore secondario predominante: assente

Taglia: molto grande

CONSERVAZIONE EX-SITU

Centro Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale

dell’Università degli Studi di Sassari – Loc. Surigheddu, SS 127bis, km 28,5 – Alghero (SS)
AGRIS Sardegna, Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei – viale Trieste 111 – Cagliari

Copyright © 2017 **RISGENSAR** – Tutti i diritti riservati