Anguria*Citrullus lanatus* [Thumb.] Matsum. et Nakoi

Specie: **Ortive**

Accessione: **ROSSA DI SANT'ANTIOCO**

Provenienza: **Sant'Antioco**

Anno collezione: 20014

Codice Accessione: 4

PLOIDIA

Ploidia: diploide

PIANTA

Lunghezza internodi: media

FOGLIA

Lunghezza foglia: 9,5 cm

Larghezza foglia: 9,1 cm

Grado lobatura primaria: forte

FRUTTO

Peso medio: da alto a molto alto (11,41 kg)

Forma sezione longitudinale: ellittica allungata

Colore fondo epidermide: verde

Intensità colore fondo epidermide: chiaro

Forma zona apicale: da appiattita a tonda

Depressione apice: superficiale

Depressione base peduncolo: media

Distribuzione solchi: su tutto il frutto

Intensità solchi: deboli

Striature: presenti

Tipo striature: chiaramente definite

Intensità colore striature: scuro

Larghezza striature: larghe

Spessore pericarpo: 1,6 cm

Colore principale polpa: rosso

Intensità colore principale polpa: scuro

Numero semi: medio

SEME

Colore principale: bruno rossastro

Colore secondario predominante: presente

Taglia: piccola

CONSERVAZIONE EX-SITU

Centro Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale

dell’Università degli Studi di Sassari – Loc. Surigheddu, SS 127bis, km 28,5 – Alghero (SS)
AGRIS Sardegna, Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei – viale Trieste 111 – Cagliari

Copyright © 2017 **RISGENSAR** – Tutti i diritti riservati